



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

Departamento de Salud del Condado de Iredell
Revisión Previo a la Vacunación del COVID-19 Vacuna Pfizer
Por favor, repásela antes de ser vacunado

Estos individuos NO pueden ser vacunados:

- Menos de 16 años- **La vacuna no está aprobada para alguien que tenga menos de 16 años de edad.**
- Enfermedad moderada a severa el día de la cita- **Espere hasta que se sienta mejor.**
- Positivo con el COVID-19 y experimentando síntomas- **Espere hasta que se sienta mejor y haya terminado con el periodo de aislamiento.**
- Actualmente en el periodo de cuarentena debido a la exposición a alguien con el COVID- **Regrese cuando haya terminado el periodo de cuarentena.**
- Si ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días- **Espere hasta que hayan pasado 14 días después de recibir cualquier otra vacuna.**
- Si recibió anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente como parte del tratamiento del COVID-19 en los últimos 90 días- **Espere hasta 90 días después del tratamiento.**
- Una reacción alérgica a cualquier marca de la vacuna del COVID-19.
- Una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, incluyendo cualquier de los siguientes:
 - Polietilenglicol (PEG), lo cual se encuentra en algunos medicamentos, tal como laxantes y los preparativos para el procedimiento de colonoscopías.
 - Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, pastillas recubiertas con capa y esteroides intravenosos.
 - Una vacuna o terapia inyectable que contiene múltiples componentes, uno de los cuales es un componente de la vacuna del COVID-19 pero no se sabe cual componente provocó la reacción inmediata.
- Recibió la primera dosis de otra marca de la vacuna y no se pudo terminar la serie con la misma marca de la vacuna del COVID-19- **Las marcas de vacunas no se pueden intercambiar; ambas dosis deben administrarse con la misma marca de vacuna.**

Estos individuos pueden vacunarse, pero se les informa de los riesgos/limitaciones:

- Capacidad de respuesta inmune debilitada, ya sea debido al uso de agentes inmunosupresores (irradiación, corticoesteroides, etc) Infección del VIH, u otras causas- **Puede tener una respuesta reducida de anticuerpos a la vacunación activa.**
- Actualmente tiene rellenos dentales- **Puede ocasionar inflamación alrededor del relleno; comuníquese con su doctor si se desarrolla inflamación en o cerca del lugar de la obturación después de vacunarse.**
- Si padece de un trastorno de sangre o si está tomando un anticoagulante-**Existe un mayor riesgo de hemorragia al lugar de la inyección. Si no ha recibido una vacuna intramuscular (IM) desde el diagnóstico del trastorno de sangre o está tomando un anticoagulante de receta médica, debe consultar con su profesional médico para aprobación de recibir una vacuna IM.**
- Si usted está embarazada- **No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres embarazadas. Hay un riesgo de resultado adverso de embarazo y los estudios están todavía en desarrollo. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la vacunación, platique con su profesional médico para tomar una decisión informada.**
- Si usted está amamantando- **No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres en lactancia o los efectos en el lactante o la producción de leche/excreción de leche. La vacuna no contiene un virus vivo, por lo tanto, no se espera que perjudique al bebé. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la vacunación, platique con su profesional médico para tomar una decisión informada.**

